




	HINCHADO YEMAS	SALIDA DE HOJAS	PRE-FLORACIÓN	FLORACIÓN	CUAJADO DE FRUTO	CIERRE DE RACIMOS	ENVERO	MADURACIÓN DE LAS BAYAS	POST-RECOLECCIÓN
EXCORIOSIS	Navaron®								
MILDIU ALTO RIESGO	Veravit® Plus		Ververol®			Asbelto®Green		Mirlo® Max	
MILDIU BAJO RIESGO	Navaron®		Asbelto®Green		Veravit® Plus		Cuprotec® 35 WG		
OIDIO	Azufri®		Kantarel®		Kantarel®		Decibel® WG		
BLACK-ROT Y MILDIU	Ororefex®								
	Decibel® WG								
POLILLA DEL RACIMO	Vijay®								
ÁCAROS	Impulssor®		Tiazosac®		Bersite®				
POLILLA DEL RACIMO Y MOSQUITO VERDE							Coraza®EC		
MALAS HIERBAS ANUALES	Inteike®								
MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA	Mamut®								
MALAS HIERBAS COMPLICADAS	Bayasant®								
MALAS HIERBAS ANUALES Y VIVACES	Trapio®			Patter®Green					



tradecorp se
escribe con

de
tratamientos
para vid



Tu cultivo,
nuestro compromiso

Alcalá, 498 - 3ª planta 28027 Madrid
T + 34 91 327 29 30
F + 34 91 304 42 00
www.tradecorp.es

Use los productos fitosanitarios de forma
segura. Lea siempre la etiqueta y la
información del producto antes de usarlos.

E-180221-V1

Tu cultivo,
nuestro compromiso



Fungicidas

Asbelto® MZ

Dimetomorf 7,5% p/p + Mancozeb 66,7% p/p (WG)

ES-00296 | 1Kg - 5Kg

Gran eficacia y amplio espectro de acción con doble modo de acción sobre hongos oomicetos que se caracteriza por su actividad sistémica, preventiva y curativa y efecto antiesporulante.

Mildiu (2 Kg/Ha)

Asbelto® Green

Dimetomorf 6% p/v + Hidróxido Cúprico 20% p/v (exp. en Cu) (SC)

ES-00373 | 5L

Acción penetrante con actividad preventiva curativa y anti-esporulante contra oomicetos y actividad bacterioestática no sistémica.

Mildiu (3L/Ha)

Asbelto® Max

Dimetomorf 50% p/v (SC)

ES-00373 | 5L

Acción penetrante de gran eficacia y especificidad; con actividad traslaminar, preventiva y curativa y efecto anti-esporulante. Formulación líquida de alta calidad y muy cómodo.

Mildiu (0,5L/Ha)

Azufril® 80DF

Azufre 80% p/p (WG)

24.423 | 1Kg - 5Kg - 25Kg

Anti-oidio con acción preventiva, curativa, erradicante y efecto acaricida.

Oidio (200-400 g/hl)

Boltex® F

M-Metalaxil 5% p/p + Folpet 40% p/p (WG)

ES-01125 | 1Kg - 5Kg

Acción sistémica y de contacto. Protección temprana con acción protectora preventiva, curativa y anti-esporulante. Con acción complementaria sobre *Botritis*.

Mildiu (2Kg/Ha)

Cuprotec® 35WG

Cobre (oxicloruro) 35% (WG)

ES-00666 | 5Kg

Organo cuprico de alta eficacia a bajas dosis de cobre

Mildiu (1,7-1,9 Kg/Ha)

Cuprital® Super

Cobre (Oxicloruro) 30% p/p +

Mancozeb 20% p/p (WP)

Complejo de Acción Biológica 6%

23.465 | 1Kg - 5Kg

Órgano-cúprico de alta calidad y acción sinérgica. Contiene complejo de acción biológica.

Mildiu (300-500 g/hl)

Decibel® wg

Kresoxim-metil 50% p/p (WG)

ES-00854 | 600g

Fungicida sistémico de la familia de las estrobilurinas que posee un amplio espectro y eficacia.

Oidio (*Uncinula necator*) y black-rot (*Guignardia bidwelli*)

Aplicar a una dosis de 300 g/Ha con un volumen de caldo de 300-1.000 L/Ha. Aplicar durante BBCH 19-81.

Etylfos® wg

Fosetil-Al 80% p/p (WG)

25.505 | 1Kg - 5Kg

Fungicida de sistemía completa ascendente y descendente en formulación de granulado dispersable en agua.

Mildiu (250-300 g/hl)

Folplan®

Folpet 50% (WP)

17.200 | 5Kg

Fungicida polivalente de contacto y preventivo con acción multi-sitio.

Mildiu y excoiosis (300-400 g/hl)

Kantarel®

Penconazol 10% p/v (EC)

24.185 | 250cc - 1L

Fungicida sistémico. Excelente contra oídio. Penetra rápidamente y protege los nuevos crecimientos.

Oidio (30-40 cc/hl)

Mirlo® Max

Cimoxanilo 45% p/p (WG)

ES-00321 | 500g

Fungicida penetrante con acción traslaminar, eficaz durante las primeras fases de desarrollo de la enfermedad.

Aplicar a 270 g/Ha, realizando un máximo de 4 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días. Tratar entre los estados BBCH 13-14 y BBCH 85.

Navaron®

Azoxistrobin 9,35% p/v + Folpet 50% p/v (SC)

ES-00164 | 1L - 5L

Fungicida específico contra mildiu, oídio y excoiosis en viña.

1,5-1,8 L/Ha contra mildiu, 1,8 L/Ha contra oídio, 0,75 L/Ha contra excoiosis

Orofrex® DP

Azufre 98,5% p/p (DP)

13.325 | 1Kg - 5Kg - 25Kg

Azufre micronizado fluente, para espolvoreo.

Araña roja, ácaros, eriófidos, oídio (20-30 Kg/Ha)

Veravit® PlusWG

8% p/p Cimoxanilo +66% p/p Folpet (WP)

ES-00259 | 6Kg

Fungicida penetrante de sistemía local y de contacto.

Mildiu (1,5 Kg/Ha)

Ververol®

Dimetomorf 6% p/p +Folpet 25% p/p +

Fosetil-Al 50% p/p

ES-00241 | 3Kg

Fungicida sistémico y penetrante con actividad preventiva, curativa y antiesporulante.

Mildiu (3 Kg/Ha)

Insecticidas

Bersite®

Abamectina 1,8% p/v (EC)

21.854 | 1L - 5L

Insecticida acaricida de efecto traslaminar y acción prolongada.

Ácaros (*Tetranychus urticae*) (50-100 cc/hl)

Coraza® EC

Deltametrin 2,5% p/v (EC)

25.706 | 1L - 5L

Insecticida de gran actividad y polivalencia con buena persistencia de protección.

Cicadélidos y polilla del racimo (0,4-0,6 L/Ha)

Impulssor®

Aceite de parafina 80% (EC)

ES-00079 | 20L

Insecticida-acaricida de amplio espectro, que actúa mediante asfixia y destaca por su acción de contacto, siendo imprescindible en estrategias de lucha anti-resistencia.

Dosis en aplicación invernal: 2,5 L/hl y dosis en aplicación estival: 10-20 L/Ha. Aplicar con un volumen de caldo de 1000 L/Ha. Realizar entre 2 y 4 aplicaciones con intervalo de 7 días entre ellas.

Tiazosac®

Hexitiazox 25,87% p/v (SC)

ES-00234 | 250cc - 1L

Acaricida específico de gran persistencia sobre ácaros tetraniquidos (arañas rojas y amarillas).

Ácaros tetraniquidos, araña roja y araña amarilla (20 cc/hl)

Vijay®

Bacillus thuringiensis var Kurstaki 32 M. uni (WP)

22.423 | 1L

Insecticida biológico para el control de *Lobesia botrana* y *Eupoecilia ambiguella*.

Polillas del racimo (0,5-1 L/Ha)

Herbicidas

Admeto®

Pendimetalina 33% (EC)

ES-00490 | 5L

Herbicida de amplio espectro y persistencia para aplicar durante la parada invernal

Malas hierbas anuales (4-6 L/Ha)

Balcony®

Glifosato 45% p/v (SL)

ES-00310 | 1L - 5L - 20L - 200 L

Herbicida de post-emergencia, no selectivo que presenta una fuerte acción sistémica frente a la mayoría de hierbas monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales y perennes. Formulación concentrada innovadora debido a la presencia de surfactantes exclusivos de última generación que facilitan la absorción y la penetración del herbicida y su traslocación en el interior de las malas hierbas tratadas, optimizando así su actividad herbicida y su eficacia.

Malas hierbas monocotiledóneas y dicotiledóneas (3,2L/Ha) y malas hierbas vivaces (6,4L/Ha).

Bayasant®

Flazasulfuron 25% (WG)

ES-00408 | 100g - 500g

Herbicida sistémico altamente eficaz, de amplio espectro y prolongado efecto remanente que controla hasta las malas hierbas más difíciles, como conyza o vallico resistente.

Malas hierbas gramíneas, dicotiledóneas y *Cyperus* spp. (60-200 g/Ha).

Inteike®

Oxifluorfen 24% p/v (EC)

23.047 | 1L - 5L - 20L

Herbicida de contacto de aplicación dirigida al suelo y larga persistencia de acción contra malas hierbas anuales.

Malas hierbas anuales en pre-emergencia y post-emergencia. (0,6 L/Ha) Aplicar en bandas.

Mamut®

Diflufenican 50% p/v (SC)

24.239 | 1L - 5L

Herbicida de contacto con efecto persistente y prolongada acción contra malas hierbas dicotiledóneas anuales.

Malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia y post-emergencia muy precoz (500-700 cc/Ha).

Patter® Green

Glifosato 36% p/v (SL)

17.118 | 1L - 5L - 10L - 20L - 200L

Herbicida sistémico no selectivo de absorción foliar rápida.

Malas hierbas anuales (3-6 L/Ha) y malas hierbas vivaces (6-10 L/Ha).

Radar®

Quizalofop-p-etil 5% p/v (EC)

24.515 | 1L - 5L

Herbicida sistémico de post-emergencia y absorción foliar.

Malas hierbas gramíneas anuales (1- 2,5 L/Ha) y gramíneas vivaces (2-4 L/Ha)

Trapio®

Diflufenican 4% p/v +

Glifosato 16% p/v (SC)

25.038 | 5L - 20L

Herbicida de post-emergencia precoz con acción por contacto sobre gramíneas y dicotiledóneas anuales y bianuales con gran efecto de acción remanente sobre dicotiledóneas anuales en cultivos de más de 4 años.

Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas anuales (1,5-9 L/Ha)